



Erkių platinamos ligos

Labiausiai paplitusios ligos

- Erkės pačios ligų nesukelia, tačiau gali pernešti užkrečiamųjų ligų sukėlėjus: virusus ir bakterijas. Siurbdama užsikrėtusio gyvūno kraują erkė gali užsikrėsti užkrečiamųjų ligų sukėlėjais. Taip pat siurbdama kraują gali sukėlėjus perduoti žmogui ar kitam gyvūnui.
- Lietuvoje erkės dažniausiai platina dvi ligas – erkinį encefalitą ir Laimo ligą, kasmet registruojama iki 3 tūkstančių Laimo ligos ir iki 500 erkinio encefalito atvejų.
- Šiomis ligomis užsikrečiama įsisiurbus infekuotai erkei (erkinio encefalitu galima užsikrėsti ir vartojant nevirintą karvių arba ožkų pieną).
- Erkės dažniausiai įsisiurbia į kaklą, pažastis, kirkšnis, lenkimo sritis.

Individualios apsaugos priemonės

- Norint apsaugoti nuo erkių platinamų ligų, patariama poilsiaujant gamtoje tinkamai apsirengti – rinktis šviesius, priglundusius rūbus ilgomis rankovėmis, užsidėti kepurę.
- Patariama nuolat apsižiūrėti ar per drabužius neropoja erkės, prieš vykstant į gamtą ir būnant joje naudoti repelentus (erkes atbaidančias medžiagas).
- Vartoti tik pasterizuotą arba virintą karvių, ožkų pieną ar

Patikimiausia apsauga nuo erkinio encefalito – skiepai. Erkinio encefalito vakcina, kurios patikimumas iki 98 proc., vaikus galima skiepyti nuo metų. Skiepijama tris kartus, galima pasirinkti įprastą ir greitesnę skiepijimo

Laimo liga

Inkubacinis periodas iki 4 sav.

I stadija (1-4 sav.)

Pasireiškia bendri infekcijos požymiai, 80-90 % - migruojanti eritema.



II stadija (kelios savaitės ar mėnesiai po eritemos atsiradimo).

Pasireiškia neurologiniai ir kardialiniai sutrikimai.

III stadija

Audinių destruktija, sąnarių pažeidimai.

Erkinis encefalitas

Inkubacinis periodas 2-28 dienos, vidutiniškai – 7-14 dienų.

I ligos fazė (1-8 d.)

Karščiavimas, raumenų, skausmas, bendras silpnumas, kaulų, galvos nuovargis,

„Tariamo pasveikimo“ periodas (1-33 d., dažniausiai 5-8 d.)

II ligos fazė (20-30 %)

CNS pažeidimo simptomai ir uždegiminiai pakitimai smegenų skystyje.

